

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**



# **FRIJOLEX<sup>®</sup> 25 SL**

**HERBICIDA - DIFENILO  
FOMESAFEN**

## **CUIDADO**

**ANTIDOTO: NO TIENE  
DENSIDAD: 1.12 g/ml a 25° C.**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR  
DAÑOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICION**

**“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”  
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
MENTALMENTE INCAPACES,  
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”**



### **USO AGRONOMICO**

#### **MODO DE ACCION:**

FRIJOLEX 25 SL es un herbicida selectivo, post emergente, que actúa por contacto, contra malezas de hoja ancha, en cultivos de frijol, soya, y maní.

#### **EQUIPO DE APLICACION:**

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación mínimo de 200 litros por hectárea. Las aplicaciones deben hacerse cuando casi no se tengan vientos y las temperaturas no sean mayores a 32°C observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso.

Calibre el equipo de aplicación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal, antes de preparar el caldo de aplicación, después de haber revisado el equipo de aplicación que se va a usar y haberlo calibrado únicamente con agua, llene con agua hasta la mitad el tanque, ponga el sistema de agitación o recirculación a trabajar y vierta la cantidad requerida de plaguicida, para que termine de llenar el tanque con agua limpia. Se recomienda usar de 200 a 400 litros de agua por Manzana o bien 285 a 570 litros de agua por hectárea

### RECOMENDACIONES DE USO:

FRIJOLEX 25 SL, debe usarse para el control de malezas de hojas anchas, cuando estas están en crecimiento activo y presentan de 2 a 4 hojas verdaderas, en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	DOSIS	MALEZAS
Frijol ( <u>Phaseolus vulgaris</u> )	1.0 – 1.5 Lt/Ha (0.7-1.0 Lt/Mz)	<u>Bidens pilosa</u> (Mozote)
Soya ( <u>Glycine max</u> )		<u>Euphorbia heterophylla</u> (Lechosa)
Mani ( <u>Arachis hypogaea</u> )		<u>Commelina sp</u> (Comelina) <u>Portulaca oleracea</u> (Verdolaga) <u>Amaranthus spp</u> (Bledo) <u>Digitaria spp</u> (Alambrillo)

### INTERVALO DE APLICACION

Aplicar cuando el nivel de malezas en el cultivo lo amerite.

### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA

Se debe considerar un intervalo de 15 días.

### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

Esperar a que el caldo de la aplicación se haya secado por completo, lo cual puede ocurrir en un par de horas.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de insecticidas, acaricidas, y fungicidas, pero no es compatible con aquellos que tienen reacción acida.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene este producto lejos de los niños, en lugares secos, aireado, lejos de alimentos, medicinas, forrajes. Manténgalo en su envase original, bien etiquetado y herméticamente cerrado. Este producto no presenta problemas de oxidación ni inflamabilidad. No causa problemas a los envases originales de fábrica.

---

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE  
HABITACION  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
APLICACION DE ESTE PRODUCTO  
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA  
LIMPIA**



**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

Irritación de los ojos y la piel, irritación de la nariz y garganta, puede causar sensibilización por contacto.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTION:** No provoque el vomito, no administre nada oral si el paciente está en estado de inconsciencia, llévelo al médico y lleve esta etiqueta o el panfleto.

**POR INHALACION:** Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado: Si la persona está consciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad. En todos los casos lleve al paciente al médico.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague con abundante agua, durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la parte afectada con abundante agua y jabón y quite las prendas contaminadas.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN  
ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:**

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION**

<b>PAIS</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>TELEFONO</b>
El Salvador	Hospital San Rafael	(503) 2525 -5800 ext 148 y 149
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	22894700 ext. 1290 celular: 8755-0983

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE**

No descargue soluciones o líquidos que contengan este producto en lagos, arroyos, estanques, océanos o depósitos de agua pública.

No contamine fuentes de agua, depósitos, canales de riego con envases o desechos.

---



**TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.**



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.**

Se prohíbe la aspersión de este producto en un perímetro menor a 50 metros de los poblados, caseríos o fuentes de agua.

### **MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES**

En caso de derrames, recójalos con aserrín u otro material absorbente y los envases perfórelos y en ambos casos deséchelos o deposítelos en los centros de acopio autorizados por la Autoridad Nacional Competente.

Los envases vacios deben enjuagarse tres veces con agua limpia y usar ese remanente en la mezcla de aplicación.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### **AVISO DE GARANTIA:**

El formulador y sus distribuidores, solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

### **FORMULADOR:**

NANJING YAMI TRADING CO., LTD.  
NANJING, CHINA.

### **IMPORTADO POR:**

CHAMORRO AGROCOMERCIAL S.A.  
Costado Norte terminal de buses  
mercado Ernesto Fernández.  
Teléfono (505) 2523-0374  
Masaya, Nicaragua.

SEM EL SALVADOR S.A DE C.V.  
25 calle oriente, entre 7ª y 9ª Av. sur  
Teléfono: 24407567  
Santa Ana, El Salvador

**PAIS**

**NUMERO DE  
REGISTRO**

**FECHA DE  
REGISTRO**

EL SALVADOR:  
NICARAGUA:

CHAG-112L-2-2011  
CHAG-112L-2-2011

22-06-2012  
27-04-2011

---