

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



## CULTIVADOR 75 WG

HERBICIDA - SULFONILUREA  
NICOSULFURON

PRECAUCIÓN  
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION”  
“MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS Y PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,  
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”

### USO AGRONOMICO:

#### MODO DE ACCION:

**Cultivador 75 WG:** Es un herbicida tipo sulfonilurea cuyo ingrediente activo es Nicosulfuron. Es un herbicida post-emergente sistémico para el control de gramíneas anual, zacates y algunas hojas anchas en el cultivo de maíz blanco y algunos maíces amarillos. Es fitotóxico a variedades de maíz dulce. La aplicación se hace post-emergente asegurándose un cultivo limpio y rendidor. Se puede usar en plantíos de maíz de siembra directa. Se aplica sobre la maleza en activo crecimiento. Inmediatamente el desarrollo de la maleza se detiene y deja de ser competencia para el cultivo. Penetra a la planta por el follaje y las raíces, su traslocación es a través del xilema y floema. El Nicosulfuron No se recomienda aplicar con insecticidas orgánicos fosforados líquidos, ni granulados aplicados al suelo, se deberá esperar un tiempo prudencial de 10 -15 días después de la aplicación. Se debe aplicar Cultivador 75 WG cuando las malezas estén en activo crecimiento, con buenas condiciones de humedad, cuando el maíz tenga entre 4 y 8 hojas desplegadas, esto se logra de 16 a 24 días después de siembra y cuando las malezas tengan entre 2-5 hojas(3-15 cm altura).

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

**Cultivador 75 WG,** se recomienda su aplicación en forma aérea (avión o helicóptero) o en forma terrestre con equipo manual o equipo impulsado por un tractor. El equipo usado en la aplicación de este producto debe ser lavado después de cada jornada de trabajo. Es poco tóxico para los humanos, aves, peces, insectos benéficos o plantas de follaje sensible o delicado; sin embargo, durante la aplicación del producto se recomienda usar ropa de protección personal.

#### FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para realizar la mezcla utilice el equipo recomendado para el manejo de plaguicidas: botas, mascarilla, anteojos, guantes y dosificaciones. Vierta la mitad del agua en el aspersor, tonel o tanque mezclador. Agregar la dosis recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Utilizar un surfactante penetrante No-iónico, para mejor efecto herbicida. Después de terminada la aplicación de la mezcla es necesario lavar el equipo por lo menos tres veces y darle mantenimiento adecuado.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

**Cultivador 75 WG,** es un herbicida de la familia de las Sulfonilureas, en formulación de gránulos dispersables en agua, que combate eficazmente las malezas gramíneas anuales y perennes, así como algunas hojas anchas, de manera sistémica y selectiva, en el cultivo de Maíz.

Malezas		Dosis	Epoca de Aplicación
<u>Rottboellia cochinchensis</u>	Caminadora		
<u>Sorghum bicolor</u>	Sorgo de grano		
<u>Sorghum halapense</u>	Zacate Johnson		
<u>Cynodon dactylum</u>	Bermuda	50.00 – 70.00	Dosis alta cuando la maleza tenga de
<u>Cenchrus spp.</u>	Mozote	Gramos por Hectárea	10-15 cm de altura*
<u>Echinochloa colonum</u>	Zacate pinto		
<u>Leptochloa spp</u>	Plumilla	35.00 – 50.00	
<u>Leptochloa filiformis</u>	Cola de Zorra	Gramos por Manzana	Dosis baja cuando tenga de
<u>Paspalum Virgatum</u>	Navajuela		5.0 – 10 cm de altura*
<u>Digitaria sanguinalis</u>	Hierba de conejo		
<u>Brachiaria mutica</u>	Zacate para		
<u>Eleusine indica</u>	Pata de gallina		
<u>Ixoporus unisetus</u>	Zacate Pítillo		
<u>Amaranthus spp</u>	Bledo		En zacates duros utilizar la
<u>Ipomoea spp</u>	Campanilla		dosis más alta
<u>Mimosa pudica</u>	Dormilona		

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Sin restricciones.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Espere que el rocío de aplicación seque sobre el follaje.

#### FITOTOXICIDAD:

**Cultivador 75 WG,** no causa fitotoxicidad a los cultivos en las dosis recomendadas, se recomienda hacer prueba de fitotoxicidad antes de la aplicación al cultivo.

#### COMPATIBILIDAD:

**Cultivador 75 WG,** puede ser mezclado con otros herbicidas de uso frecuente en el maíz como 2,4-D, atrazina, y otros. Puede aplicarse con insecticidas carbamatos como el metomyl. Se aplica una vez por ciclo de cultivo. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación al cultivo.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. el filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo.

- Evite el contacto directo con el producto.
- Evite respirar la llovizna de aspersión.
- Bañase con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.
- Use ropa limpia en cada jornada de trabajo.
- No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

**ALMACENAMIENTO TRANSPORTE:** No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso domestico. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envase sin cerrar.

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION”,  
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.



“NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO”, “BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA”.



#### SINTOMAS DE INTOXICACION:

Dolor de cabeza, temblores, sudoración, anestesia facial y reacciones anafiláticas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTION:** No provoque el vomito, se recomienda llevar al paciente al médico para realizar un lavado gástrico.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

**POR INHALACION:** llevar al paciente a un lugar ventilado. Si la indisposición persiste acudir al m.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague copiosamente con agua limpia, durante un tiempo mínimo de 15 minutos

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.**

#### ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto específico. El tratamiento deberá ser sintomático y de sostén.

#### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION :

PAIS	INSTITUCION	TELEFONO
Guatemala	Centro de Información Toxicológica	22320735
Belice	Karl Heusner Memorial Hospital	230778
El Salvador	Ministerio de Salud	22880417
Honduras	Hospital Escuela Honduras	2322322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	22897150
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	22231028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	2692741

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

- Este es un producto que no presenta riesgo comprobado a la naturaleza, sin embargo se debe de tomar las precauciones necesaria como: alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta trascurrida una semana de efectuada la aplicación.
- No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames; ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc.

#### TOXICO PARA EL GANADO



TOXICO PARA PECES Y CRUTACEOS, NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad de por lo menos 40cm, lejos de fuentes de agua, ríos, lagunas, caseríos, etc. recoja lo derramado con un material absorbente como aserrín y entierrelo de la misma forma que con los envases desechados.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTIA:**

El fabricante y sus distribuidores, solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

**FABRICANTE Y FORMULADOR**

NANJING YAMI TRADING CO., LTD.  
NANJING, CHINA

PARA:

CHAMORRO AGROCOMERCIAL, S.A.  
FRENTE AL PARQUE LA REFORMA.  
MASAYA, NICARAGUA.  
TEL: (505) 2522-9861

**PAIS**

GUATEMALA  
BELICE  
EL SALVADOR  
HONDURAS  
NICARAGUA  
COSTA RICA  
PANAMA  
REPUBLICA DOMINICANA

**NUMERO DE  
REGISTRO**

**FECHA DE  
REGISTRO**